

## Suites et séries de fonctions

### 1. Suites de fonctions

DÉFINITION 1. Soit  $I$  un intervalle (borné ou pas borné) de  $\mathbb{R}$ . Une *suite de fonctions sur  $I$*  est une liste ordonnée

$$f_0, f_1, f_2, \dots, f_n, \dots$$

où, pour tout  $n$ ,  $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$  (or  $\mathbb{C}$ ) est une fonction définie sur  $I$  à valeurs réelles (ou complexes). On note cette suite par  $(f_n)_{n \geq 0}$ . Plus généralement, on peut considérer des suites de fonctions  $(f_n)_{n \geq n_0}$ , où  $n_0$  est un entier fixé.

Si  $(f_n)_{n \geq 0}$  est une suite de fonctions sur  $I$ , alors pour tout  $a \in I$  on obtient la suite numérique

$$f_0(a), f_1(a), f_2(a), \dots, f_n(a), \dots$$

obtenue en évaluant chaque fonction de la suite en  $a$ .

EXEMPLE 1. (a) On considère la suite  $(x^n)_{n \geq 0}$  comme suite de fonctions sur  $I = \mathbb{R}$ . Si  $a \in \mathbb{R}$  est fixé, en évaluant cette suite en  $x = a$  on obtient la suite numérique  $(a^n)_{n \geq 0}$ , qui est la suite géométrique de raison  $a$ .

(b) La suite  $(e^{ixn})_{n \geq 0}$  est une suite de fonctions sur  $I = \mathbb{R}$  à valeurs complexes. Si  $a \in \mathbb{R}$  est fixé, en évaluant cette suite en  $x = a$ , on obtient la suite numérique à valeurs complexes  $(e^{ia n})_{n \geq 0}$  (qui est également une suite géométrique, de raison  $e^{ia}$ ). Par exemple : si  $x = 0$ , alors  $e^{i0n} = 1$  pour tout  $n$ , d'où en évaluant la suite  $(e^{ixn})_{n \geq 0}$  en  $x = 0$  on obtient la suite constante  $1, 1, \dots$  ; si  $x = \pi$ , alors  $e^{i\pi n} = \cos(n\pi) + i \sin(n\pi) = (-1)^n$  pour tout  $n$ , d'où en évaluant la suite  $(e^{ixn})_{n \geq 0}$  en  $x = \pi$  on obtient la suite alternée  $1, -1, 1, -1, \dots$ .

REMARQUE 1. Si  $(f_n)_{n \geq 0}$  est une suite de fonctions  $f_n : I \rightarrow \mathbb{C}$  définies sur  $I$  à valeurs complexes, on obtient deux suites  $(\operatorname{Re} f_n)_{n \geq 0}$  et  $(\operatorname{Im} f_n)_{n \geq 0}$  de fonctions sur  $I$  à valeurs réelles, où pour tout indice  $n$  les fonctions  $\operatorname{Re} f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$  et  $\operatorname{Im} f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$  sont définies en  $x \in I$  en prenant respectivement la partie réelle et la partie imaginaire de  $f_n(x)$ , c'est-à-dire :

$$(\operatorname{Re} f_n)(x) = \operatorname{Re}(f_n(x)) \quad \text{et} \quad (\operatorname{Im} f_n)(x) = \operatorname{Im}(f_n(x)).$$

EXEMPLE 2. Si  $f_n(x) = e^{inx} = \cos(nx) + i \sin(nx)$  alors  $(\operatorname{Re} f_n)(x) = \cos(nx)$  et  $(\operatorname{Im} f_n)(x) = \sin(nx)$ .

REMARQUE 2. Comme pour les suites numériques, on peut considérer des suites de fonctions  $(f_n)_{n \geq n_0}$  où  $n_0$  est un entier fixé.

DÉFINITION 2. Soit  $(f_n)_{n \geq 0}$  une suite de fonctions  $f_n : I \rightarrow \mathbb{C}$ .

On dit que  $(f_n)_{n \geq 0}$  *converge en*  $x_0 \in I$  lorsque la suite numérique  $(f_n(x_0))_{n \geq 0}$  est convergente.


On dit que  $(f_n)_{n \geq 0}$  *converge simplement sur  $I$  vers la fonction  $f$*  lorsque  $f$  est une fonction définie sur  $I$  et pour tout  $x \in I$  la suite numérique  $(f_n(x))_{n \geq 0}$  (obtenue en évaluant chaque fonction  $f_n$  en  $x$ ) converge vers le nombre  $f(x)$  pour  $n \rightarrow +\infty$ , c'est-à-dire : pour tout  $x \in I$  on a  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x)$ .

EXEMPLE 3. La suite  $(x^n)_{n \geq 0}$  converge en  $x \in I = ]-1, 1[$  et ne converge pas en  $x \notin I$ . Plus précisément :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x^n = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in ]-1, 1[, \\ 1 & \text{si } x = 1, \\ +\infty & \text{si } x > 1, \\ \text{n'existe pas} & \text{si } x \leq -1 \end{cases}$$

Par conséquent,  $(x^n)_{n \geq 0}$  converge simplement sur  $I$  vers la fonction

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in ]-1, 1[, \\ 1 & \text{si } x = 1. \end{cases}$$



Par la suite on aura besoin de la notion de borne supérieure (ou supremum).

DÉFINITION 3. Soit  $E \subset \mathbb{R}$  une partie qui possède un majorant (c'est-à-dire, il existe  $M \in \mathbb{R}$  tel que  $x \leq M$  pour tout  $x \in E$ ). La *borne supérieure (ou supremum)* de  $E$ , notée  $\sup E$ , est le plus petit des majorants de  $E$ . Si  $E$  n'est pas majoré, on écrit  $\sup E = +\infty$ .

EXEMPLE 4. Si  $E = [1, 2[$  ou  $E = [1, 2]$ , alors  $\sup E = 2$ . Si  $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$  et  $E = \{1 - \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$ , alors  $\sup E = 1$ .

Soient  $f, g : I \rightarrow \mathbb{C}$  deux fonctions définies sur un même interval  $I$  de  $\mathbb{R}$ . Pour tout  $x \in I$  fixé,  $|f(x) - g(x)|$  est la distance entre les points des graphes de  $f$  et  $g$  au-dessus de  $x$ . On écrit usuellement  $\sup_{x \in I} |f(x) - g(x)|$  au lieu de  $\sup\{|f(x) - g(x)| : x \in I\}$ . C'est un nombre réel non-négatif qu'on abrège par  $\|f - g\|_\infty$  : donc

$$\|f - g\|_\infty = \sup_{x \in I} |f(x) - g(x)| = \sup\{|f(x) - g(x)| : x \in I\}.$$

DÉFINITION 4. Soit  $(f_n)_{n \geq 0}$  une suite de fonctions  $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$  (ou  $\mathbb{C}$ ). On dit que  $(f_n)_{n \geq 0}$  converge uniformément sur  $I$  vers  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  (ou  $\mathbb{C}$ ) lorsque

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|f_n - f\|_\infty = 0,$$

où

$$\|f_n - f\|_\infty = \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)|.$$

EXEMPLE 5. (a) La suite  $(f_n)_{n \geq 1}$  de fonctions sur  $I = [-\pi, \pi]$  définie par  $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{n}$  pour tout  $n \geq 1$  et tout  $x \in I$  converge uniformément sur  $I$  vers la fonction nulle  $f$  donnée par  $f(x) = 0$  pour tout  $x \in I$ . En effet, pour  $n \geq 0$  fixé, on a

$$0 \leq \|f_n - f\|_\infty = \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in [-\pi, \pi]} \left| \frac{\sin(nx)}{n} - 0 \right| = \sup_{x \in [-\pi, \pi]} \left| \frac{\sin(nx)}{n} \right| \leq \frac{1}{n}.$$

Ainsi  $0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_\infty \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$  donne  $\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_\infty = 0$ .

(b) La suite  $(x_n)_{n \geq 0}$  converge simplement sur  $I = [0, 1[$  vers la fonction nulle  $f(x) = 0$  pour tout  $x$ . La convergence n'est toutefois pas uniforme, car

$$\|f_n - f\|_\infty = \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in [0, 1[} x^n = 1.$$

Ainsi la suite numérique  $(\|f_n - f\|_\infty)_{n \geq 0}$ , qui est la suite constante égale à 1, ne converge pas vers 0.

La notion de convergence forte est plus forte de celle de convergence simple.

PROPOSITION 1. Si  $(f_n)$  converge uniformément sur  $I$  vers  $f$ , alors  $(f_n)$  converge simplement sur  $I$  vers  $f$ . La propriété réciproque n'est pas vraie (voir l'exemple précédent).

Le lien entre la convergence d'une suite de fonction est celle de ses parties réelle et imaginaire est donné par la proposition suivante.

PROPOSITION 2. La suite  $(f_n)$  converge simplement sur  $I$  vers  $f$  si et seulement si les suites  $(\operatorname{Re} f_n)$  et  $(\operatorname{Im} f_n)$  convergent simplement sur  $I$  respectivement vers  $\operatorname{Re} f$  et vers  $\operatorname{Im} f$ . La propriété analogue est vraie pour la convergence uniforme.

## 2. Séries de fonctions

Soit  $(f_n)_{n \geq 0}$  une suite de fonctions définies sur un même intervalle  $I$  de  $\mathbb{R}$  à valeurs réelles ou complexes. Dans cette section on étudie les différentes notions de convergence de la série de fonctions  $\sum_{n \geq 0} f_n$ .

DÉFINITION 5. La suite des sommes partielles de la série de fonctions  $\sum_{n \geq 0} f_n$  est la suite  $(S_n)_{n \geq 0}$  de fonctions sur  $I$ , où, pour tout  $n \geq 0$  fixé,  $S_n$  est la fonction sur  $I$  définie par  $S_n(x) = \sum_{k=0}^n f_k(x)$  pour tout  $x \in I$ . La fonction  $S_n$  est la somme partielle  $n$ -ème de la série de fonctions  $\sum_{n \geq 0} f_n$ .

- On dit que la série de fonctions  $\sum_{n \geq 0} f_n$  converge en  $x_0 \in I$  si la série numérique  $\sum_{n \geq 0} f_n(x_0)$  converge, c'est-à-dire si la suite numérique  $(S_n(x_0))_{n \geq 0}$  des sommes partielles évaluées en  $x_0$  est convergente. On note  $S(x_0)$  la limite :  $S(x_0) = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(x_0)$ . On appelle le nombre  $S(x_0)$  la somme de la série  $\sum_{n \geq 0} f_n$  en  $x_0$ , écrit  $S(x_0) = \sum_{n \geq 0} f_n(x_0)$  ou bien  $S(x_0) = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x_0)$ .
- On dit que la série de fonctions  $\sum_{n \geq 0} f_n$  converge simplement sur  $I$  si elle converge en tout  $x \in I$ . Ceci équivaut à dire que la suite  $(S_n)$  converge simplement sur  $I$ . On note  $S(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(x) = \sum_{n \geq 0} f_n(x)$  pour tout  $x \in I$  fixé. On obtient ainsi une fonction  $S : I \rightarrow \mathbb{R}$  (ou  $\mathbb{C}$ ) qui associe à tout  $x \in I$  la somme  $S(x)$  de la série numérique  $\sum_{n \geq 0} f_n(x)$ . La fonction  $S$  s'appelle la somme sur  $I$  de la série de fonctions  $\sum_{n \geq 0} f_n$ , ce qu'on l'écrit

$$S = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \sum_{n \geq 0} f_n.$$

- On dit que la série de fonctions  $\sum_{n \geq 0} f_n$  converge absolument sur  $I$  si la série numérique  $\sum_{n \geq 0} |f_n(x)|$  converge pour tout  $x \in I$ .
- On dit que la série de fonctions  $\sum_{n \geq 0} f_n$  converge uniformément sur  $I$  vers la somme  $S : I \rightarrow \mathbb{R}$  (ou  $\mathbb{C}$ ) lorsque la suite  $(S_n)_{n \geq 0}$  converge uniformément vers  $S$ .
- On dit que la série de fonctions  $\sum_{n \geq 0} f_n$  converge normalement sur  $I$  s'il existe une série numérique  $\sum_{n \geq 0} a_n$  telle que :
  - $a_n \geq 0$  pour tout  $n$  (c'est-à-dire  $\sum_{n \geq 0} a_n$  est une série à termes positifs),
  - $\sum_{n \geq 0} a_n$  converge,
  - Pour tout  $n \geq 0$  fixé et pour tout  $x \in I$  on a :  $|f_n(x)| \leq a_n$ .

REMARQUE 3. Comme dans le cas des séries numériques, on pourrait considérer des séries de fonctions de la forme  $\sum_{n \geq n_0} f_n$ , où  $n_0$  est un entier fixé.

EXEMPLE 6. On considère la série géométrique  $\sum_{n \geq 0} x^n$  avec  $x \in \mathbb{R}$ . On sait que

$$S_n(x) = \begin{cases} \frac{1-x^{n+1}}{1-x} & \text{si } x \neq 1, \\ n+1 & \text{si } x = 1. \end{cases}$$

Ceci définit la suite  $(S_n)$  de ses sommes partielles. Pour tout  $x$  fixé on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{1-x} & \text{si } |x| < 1, \\ \text{n'existe pas} & \text{sinon.} \end{cases}$$

Donc la série de fonctions  $\sum_{n \geq 0} x^n$  converge simplement sur  $I = ]-1, 1[$  vers la fonction  $S : ]-1, 1[ \rightarrow \mathbb{R}$  donnée par  $S(x) = \frac{1}{1-x}$ .

La convergence de  $\sum_{n \geq 0} x^n$  vers  $S$  n'est pas uniforme sur  $] - 1, 1[$ . En effet, soit  $n \geq 0$  fixé. Alors

$$|S_n(x) - S(x)| = \left| \frac{1-x^{n+1}}{1-x} - \frac{1}{1-x} \right| = \frac{|x|^{n+1}}{|1-x|},$$

d'où

$$\|S_n - S\|_\infty = \sup_{x \in ]-1, 1[} |S_n(x) - S(x)| = \sup_{x \in ]-1, 1[} \frac{|x|^{n+1}}{|1-x|} = \sup_{x \in [0, 1[} \frac{x^{n+1}}{1-x} = +\infty.$$

La suite numérique  $(\|S_n - S\|_\infty)_{n \geq 0}$  ne peut être convergente vers 0.

La série de fonctions  $\sum_{n \geq 0} x^n$  converge absolument sur  $] - 1, 1[$ , car pour tout  $x \in ] - 1, 1[$  fixé la série  $\sum_{n \geq 0} |x^n|$  converge.

PROPOSITION 3 (Liens entre les notions de convergence). .

- Si la série de fonctions  $\sum_{n \geq 0} f_n$  est absolument convergente sur  $I$ , alors elle est aussi simplement convergente sur  $I$ .
- Si  $\sum_{n \geq 0} f_n$  est uniformément convergente sur  $I$ , alors elle est aussi simplement convergente sur  $I$ .
- Si  $\sum_{n \geq 0} f_n$  est normalement convergente sur  $I$ , alors elle est aussi uniformément convergente sur  $I$  et absolument convergente sur  $I$ , donc simplement convergente sur  $I$ .

REMARQUE 4. Les convergences normale et absolue nous assurent la convergence simple d'une série de fonctions  $\sum f_n$ , mais ne donnent pas de méthode pour déterminer sa somme.

EXEMPLE 7. La série géométrique  $\sum_{n \geq 0} x^n$  converge normalement sur tout intervalle de la forme  $[-a, a]$  avec  $0 < a < 1$ . En effet : pour tout  $n \geq 0$  et tout  $x \in [-a, a]$  on a  $|x^n| = |x|^n \leq a^n$  et la série géométrique  $\sum_{n \geq 0} a^n$  est convergente. Par conséquent, la série géométrique  $\sum_{n \geq 0} x^n$  converge uniformément sur tout intervalle de la forme  $[-a, a]$  avec  $0 < a < 1$ .

PROPOSITION 4 (Parties réelles et imaginaires). Soit  $\sum f_n$  une série de fonctions  $f_n : I \rightarrow \mathbb{C}$  et soient  $\sum \operatorname{Re} f_n$  et  $\sum \operatorname{Im} f_n$  les séries de ses parties réelles et imaginaires. Alors :  $\sum f_n$  converge simplement (respectivement, uniformément/absolument/normalement) sur  $I$  si et seulement si  $\sum \operatorname{Re} f_n$  et  $\sum \operatorname{Im} f_n$  le font. Dans ce cas,  $\sum f_n = S$  si et seulement si  $\sum \operatorname{Re} f_n = \operatorname{Re} S$  et  $\sum \operatorname{Im} f_n = \operatorname{Im} S$ .

PROPOSITION 5 (Propriétés des séries uniformément convergentes). Soit  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  une série de fonctions  $f_n$  sur  $I$  à valeurs réelles ou complexes.

(a) Supposons que pour tout  $n$  la fonction  $f_n$  est continue sur  $I$ . Si  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  converge uniformément sur  $I$  vers  $S$ , alors  $S$  est continue sur  $I$ .

(b) Supposons que :

- $f_n$  est continue sur  $I$  pour tout  $n$ ,
- $\sum_{n \geq n_0} f_n$  converge simplement sur  $I$  vers  $S$ ,
- $S$  est continue sur  $I$ ,
- $\sum_{n \geq n_0} \int_I |f_n(x)| dx$  converge.

Alors  $\int_I (\sum_{n \geq n_0} f_n(x)) dx = \sum_{n \geq n_0} \int_I f_n(x) dx$ .

(c) Supposons que :

- $f_n$  est dérivable sur  $I$  et sa dérivée  $f'_n$  est continue sur  $I$  pour tout  $n$ ,
- $\sum_{n \geq n_0} f_n$  converge simplement sur  $I$  vers  $S$ ,
- $\sum_{n \geq n_0} f'_n$  converge uniformément sur  $I$ .

Alors  $S$  est dérivable sur  $I$  et

$$S'(x) = \left( \sum_{n \geq n_0} f_n(x) \right)' = \sum_{n \geq n_0} f'_n(x).$$

EXEMPLE 8. On veut calculer la somme de la série de fonctions  $\sum_{n \geq 1} nx^{n-1}$  pour  $x \in I = [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ . On remarque que  $nx^{n-1} = f'_n(x)$  pour  $f_n(x) = x^n$ . Plus précisément (since  $(x^0)' = 1' = 0$ ), on a :

$$\sum_{n \geq 1} nx^{n-1} = \sum_{n \geq 1} (x^n)' = \sum_{n \geq 0} (x^n)'.$$

En outre,  $f'_n(x) = nx^{n-1}$  est continue sur  $I$  et la série  $\sum_{n \geq 0} f_n(x) = x^n$  converge simplement sur  $I$  vers  $\frac{1}{1-x}$ . En plus,  $\sum_{n \geq 1} nx^{n-1}$  converge uniformément sur  $I$ . En effet, cette série converge normalement, car pour tout  $n \geq 1$  on a :  $|nx^{n-1}| = n|x|^{n-1} \leq n(\frac{1}{2})^{n-1}$  et la série numérique  $\sum_{n \geq 1} n(\frac{1}{2})^{n-1}$  est convergente (ceci peut être vérifié au moyen de la règle d'Alembert).

La partie (b) de la proposition 5 avec  $f_n(x) = x^n$  pour tout  $n \geq 0$  et  $I = [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$  montre alors que

$$\sum_{n \geq 1} nx^{n-1} = \sum_{n \geq 0} (x^n)' = \left( \sum_{n \geq 0} x^n \right)' = \left( \frac{1}{1-x} \right)' = \frac{1}{(1-x)^2}.$$

### 3. Séries de Taylor

Les séries de Taylor forment une classe importante de séries de fonctions.

DÉFINITION 6. Soit  $I = ]a, b[$  un intervalle (borné ou pas) de  $\mathbb{R}$ . On dit qu'une fonction  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  (ou  $\mathbb{C}$ ) est *indéfiniment dérivable* sur  $I$  lorsque  $f$  possède dérivée  $n$ -ème  $f^{(n)}$  sur  $I$  pour tout  $n = 0, 1, 2, \dots$ . On écrit alors  $f \in C^\infty(I)$ .

On rappelle que  $f^{(0)} = f$  et que pour  $n \geq 1$ ,  $f^{(n)}$  est la dérivée de  $f^{(n-1)}$ . Ainsi :

$$\begin{aligned} f^{(0)}(x) &= f(x), \\ f^{(1)}(x) &= (f^{(0)})'(x) = f'(x) = \frac{df}{dx}(x), \\ f^{(2)}(x) &= (f^{(1)})'(x) = (f')'(x) = f''(x) = \frac{d^2f}{dx^2}(x), \\ &\vdots \\ f^{(n)}(x) &= (f^{(n-1)})'(x) = \left(\frac{d^{n-1}f}{dx^{n-1}}\right)'(x) = \frac{d^n f}{dx^n}(x). \end{aligned}$$

DÉFINITION 7. Soit  $f$  une fonction indéfiniment dérivable sur  $I = ]a, b[$ . La *série de Taylor* de  $f$  en  $x = x_0 \in I$  est la série de fonctions

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} (x - x_0)^2 + \frac{f^{(3)}(x_0)}{3!} (x - x_0)^3 + \dots$$

La série de Taylor  $x_0 = 0$  s'appelle aussi *série de MacLaurin*. Elle est donc

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!} x^3 + \dots$$

EXEMPLE 9. La fonction  $f(x) = \cos(x)$  est indéfiniment dérivable sur  $I = \mathbb{R}$ . On a :

$$\begin{aligned} f^{(0)}(x) &= \cos(x), & f^{(1)}(x) &= (\cos(x))' = -\sin(x), \\ f^{(2)}(x) &= (-\sin(x))' = -\cos(x), & f^{(3)}(x) &= (-\cos(x))' = \sin(x) \end{aligned}$$

et, en général, pour tout  $k \geq 0$  :

$$\begin{aligned} f^{(4k)}(x) &= \cos(x), & f^{(4k+1)}(x) &= (\cos(x))' = -\sin(x), \\ f^{(4k+2)}(x) &= (-\sin(x))' = -\cos(x), & f^{(4k+3)}(x) &= (-\cos(x))' = \sin(x). \end{aligned}$$

Si par exemple  $x_0 = 0$ , alors

$$f^{(4k)}(0) = 1, \quad f^{(4k+1)}(0) = 0, \quad f^{(4k+2)}(0) = -1, \quad f^{(4k+3)}(0) = 0.$$

Puisque  $4k = 2(2k)$  et  $4k + 2 = 2(2k + 1)$  sont pairs tandis que  $4k + 1$  et  $4k + 3$  sont impairs, on a donc pour tout  $n \geq 0$  :

$$f^{(2n)}(0) = (-1)^n \quad \text{et} \quad f^{(2n+1)}(0) = 0.$$

La série de Taylor de  $f(x) = \cos(x)$  en  $x = 0$  (c'est-à-dire la série de MacLaurin de  $f(x) = \cos(x)$ ) est donc

$$\begin{aligned} \sum_{n \geq 0} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n &= \sum_{n \geq 0} \frac{f^{(2n)}(0)}{(2n)!} x^{2n} \quad [\text{car } f^{(2n+1)}(0) = 0] \\ &= \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} \end{aligned}$$

REMARQUE 5. Soit  $I$  un intervalle ouvert de  $\mathbb{R}$  qui contient 0. La série de MacLaurin d'une fonction  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  est une série de fonctions de la forme  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  où pour tout  $n$  on a  $a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \in \mathbb{R}$ .

Une série de la forme  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  s'appelle une *série de puissances* (car les  $x^n$  sont les puissances de la variable  $x$ ).

Un cas particulier est donné par la série géométrique  $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ , pour laquelle  $a_n = 1$  pour tout  $n$ . On a vu que cette série converge simplement sur  $] -1, 1[$  vers la fonction  $f(x) = \frac{1}{1-x}$ . On peut vérifier que pour la fonction  $f(x) = \frac{1}{1-x}$  on a  $\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = 1$  pour tout  $n$ . Donc  $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$  est la série de MacLaurin de  $f(x) = \frac{1}{1-x}$ . L'égalité  $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$  dit que que la série de MacLaurin de  $f(x) = \frac{1}{1-x}$  a pour somme  $f(x)$  (convergence simple) sur  $] -1, 1[$ . On dit alors que  $f(x) = \frac{1}{1-x}$  est développable en série de MacLaurin sur  $] -1, 1[$ . On généralise cette propriété au moyen de la définition suivante.

DÉFINITION 8. On dit qu'une fonction  $f$  est *développable en série de Taylor en  $x = x_0$*  s'il existe un intervalle  $I = ]a, b[ \subset I$  contenant  $x_0$  tel que :

- $f \in C^\infty(I)$ ,
- la série de Taylor de  $f$  en  $x_0$  converge simplement vers  $f$  sur  $I$ , c'est-à-dire

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n = f(x) \quad \text{pour tout } x \in I.$$

La proposition suivante donne un critère simple pour vérifier si une fonction est développable en série de Taylor en  $x_0$ .

PROPOSITION 6. *Supposons que la fonction  $f$  soit indéfiniment dérivable dans l'intervalle  $I$  contenant  $x_0$ . S'il existe des constantes  $M \geq 0$  et  $a > 0$  telles que pour tout  $n \geq 0$  et pour tout  $x \in I$  on a :  $|f^{(n)}(x)| \leq M a^n$ , alors  $f$  est développable en série de Taylor en  $x_0$ .*

EXEMPLE 10. La fonction  $f(x) = \cos(x)$  est indéfiniment dérivable sur  $\mathbb{R}$  et ses dérivées  $f^{(n)}(x)$  sont de la forme  $\pm \cos(x)$  ou bien  $\pm \sin(x)$ . Ainsi, pour tout  $n \geq 0$  et tout  $x \in \mathbb{R}$  on a  $|f^{(n)}(x)| \leq 1$ . Par conséquent, la fonction  $f(x) = \cos(x)$  est développable en série de Taylor en tout  $x_0 \in \mathbb{R}$ . En particulier, elle est développable en série de Taylor en  $x_0 = 0$  et l'exemple ci-dessus donne donc :  $\cos(x) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}$ .